



Αθήνα 05/04/2017

Προς

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)

Θέμα: «Ενδοφθάλμιες εγχύσεις φαρμάκων

Συνθήκες λειτουργίας οφθαλμιατρικών κέντρων»

Όπως γνωματεύει και η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ. Πρωτ. 8788/04/02/2016, συμφωνούμε απόλυτα για τα παρακάτω:

1. Οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας θεραπεύονται επιτυχώς τα τελευταία 11 (ένδεκα) έτη με χορήγηση ενδοϋαλοειδικών παραγόντων για οφθαλμική χρήση
2. Στη χώρα μας είναι διαθέσιμα βάσει εγκρίσεων ΕΟΦ τα ιδιοσκευάσματα Lucentis, Eylea, Macugen, Ozurdex και Jetrea για νεοαγγειακές παθήσεις, παθήσεις διαπερατότητας και παθήσεις υαλοδοαμφιβληστροειδικής επιφάνειας, καθώς και το ιδιοσκεύασμα Visudyne, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη οφθαλμική αντισηψία, καθώς δεν χορηγείται ενδοϋαλοειδικά.
3. Η χορήγηση αυτών των σκευασμάτων γίνεται στην χώρα μας υπό άσηπτες συνθήκες, όπως ακριβώς ορίζεται στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών χρήσης των ανωτέρω προϊόντων



4. Οι άσηπτες συνθήκες δεν προϋποθέτουν κατ' ανάγκην χορήγηση αποκλειστικά σε νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ή χώρο χειρουργείου
5. Σε έρευνα μεταξύ των Αμερικανών ειδικών αμφιβληστροειδούς (Retinal Specialists) το 98,4 % αυτών απάντησε ότι εκτελεί τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις στο ιατρείο τους (Δημοσιευμένη έρευνα στο συνέδριο American Academy of Ophthalmologists 2013)
6. Ευθύνη του θεράποντα οφθαλμιάτρου είναι να διασφαλίζονται οι άσηπτες συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένο ότι τόσο οι διεθνούς αναγνώρισης κατευθυντήριες οδηγίες για χρήση ενδοϋαλοειδικών παραγόντων, όσο και η σύγχρονη κλινική πρακτική στις Ευρωπαϊκές Χώρες αλλά και στην Βόρεια Αμερική, περιλαμβάνουν την χορήγηση ενδοϋαλοειδικών παραγόντων σε χώρους εξωτερικών ιατρείων, μικροχειρουργείων και τακτικών ιατρείων, προκαλεί προβληματισμό η επιλεκτική διάθεση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ των σκευασμάτων μόνο για χορήγηση σε ιδιωτικές κλινικές και η άρνηση διάθεσής τους όταν η χορήγηση θα διεξαχθεί σε οποιονδήποτε άλλο ιατρικό χώρο που τηρεί άσηπτες συνθήκες.

Ελπίζουμε να διορθώσετε αυτή τη στρέβλωση και να επιτρέψετε την χρήση των παραγόντων αυτών στον χώρο που ο θεράποντας ιατρός θα εφαρμόσει την άσηπτη τεχνική

Ο ΓΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας, MD

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΩΝΗΣ, Γεώργιος, MD